


贝灵®

# 布洛芬混悬液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用



## 【药品名称】

通用名称:布洛芬混悬液  
英文名称:Ibuprofen Suspension  
汉语拼音:Buluofen Hunxuanye

## 【成份】

本品每毫升含活性成份布洛芬 20 毫克,辅料为:预胶化淀粉、黄原胶、甘油、蔗糖、无水枸橼酸、苯甲酸钠、聚山梨酯 80、草莓香精、黄色素 10 号、诱惑红。

## 【性状】

本品为橙色混悬液,味甜,有调味剂的芳香。

## 【作用类别】

本品为解热镇痛类非处方药品。

## 【适应症】

用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛,如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。

## 【规格】100 毫升:2 克

## 【用法用量】

口服。12 岁以下小儿用量见下表:

年龄(岁)	体重(公斤)	一次用量(毫升)	次数
1-3	10-15	4	若持续疼痛或发热,可间隔 4-6 小时重复用药 1 次,24 小时不超过 4 次。
4-6	16-21	5	
7-9	22-27	8	
10-12	28-32	10	

使用前请摇匀。

## 【不良反应】

- 少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。
- 罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛。
- 其他不良反应包括:腹痛、乏力、无菌性脑膜炎、贫血、骨髓毒性、嗜酸性粒细胞增多、血小板减少、超敏反应、过敏、脑血管意外、精神运动过度活跃、视觉障碍、心衰、心肌梗死、心悸、出血(非消化道)、高血压、哮喘、支气管痉挛、便秘、腹泻、消化道出血、消化道炎症、消化道溃疡、消化道溃疡出血、消化道溃疡穿孔、口腔不适(局部烧灼感、刺激)、胰腺炎、肝毒性(肝功能异常、肝炎、转氨酶升高)、血管性水肿、伴嗜酸性粒细胞增多和全身系统症状药疹(DRESS)、红斑、多形性红斑、瘙痒、Stevens-Johnson 综合征、中毒性表皮坏死松解症、荨麻疹、肾炎、肾脏损害、低体温、急性泛发性发疹性脓疱病(AGEP)、固定皮疹、胆管消失综合征、过敏性冠状动脉痉挛综合征。

## 【禁忌】

- 对其他非甾体抗炎药过敏者禁用。
- 对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。
- 对本品过敏者禁用。
- 心脏手术前后禁用。

## 【注意事项】

- 本品为对症治疗药,不宜长期或大量使用,用于止痛不得超过 5 天,用于解热不得超过 3 天,症状不缓解,请咨询医师或药师。
- 有下列情况患者慎用:支气管哮喘、肝肾功能不全、凝血机制或血小板功能障碍(如血友病)。
- 下列情况患者应在医师指导下使用:有消化性溃疡史、胃肠道出血、心功能不全、高血压。
- 1 岁以下儿童应在医师指导下使用。
- 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品(如某些复方抗感冒药)。

- 如服用过量或出现严重不良反应,应立即就医。
- 对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。
- 本品性状发生改变时禁止使用。
- 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 儿童必须在成人监护下使用。
- 由于持续的呕吐、腹泻或液体摄入不足而出现明显的脱水需就医,以纠正水及电解质平衡。
- 如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。因布洛芬可降低阿司匹林的保护心脏、中风和抗血小板活性的作用,正在服用阿司匹林的患者,应慎用本品。
- 本品配有儿童安全盖,其打开方式见说明书所附图示。
- 随着使用剂量和持续时间的增加,或伴有患者服用皮质类固醇、饮酒、抗凝剂、血小板聚集抑制剂(如阿司匹林)、其他非甾体抗炎药等因素,发生胃肠道出血、严重的心血管血栓性事件、心肌梗死、脑卒中和过敏性冠状动脉痉挛综合征的风险可能会增加。有心血管疾病或心血管疾病危险因素的患者,其风险更大。如出现胃肠道出血或溃疡、胸痛、气短、无力、言语含糊等情况,应停药并咨询医师。
- 使用本品如出现过敏症状,尤其是对阿司匹林过敏的患者,应立即停药并咨询医师。过敏症状可能包括荨麻疹、面部肿胀、哮喘(喘息)、休克、皮肤发红、皮疹或水泡伴有或未伴有发热或红斑,严重的皮肤不良反应还包括多形性红斑、Stevens-Johnson 综合征(SJS)、中毒性表皮坏死溶解症(TEN)、伴嗜酸粒细胞增多、全身系统症状的药疹(DRESS)和急性泛发性发疹性脓疱病(AGEP)。
- 有下列情况患者慎用:肾脏疾病、肝脏疾病、心脏疾病、高血压、体液潴留、服用利尿剂。
- 胃肠疾病患者应谨慎使用非甾体类抗炎药,包括消化性溃疡病,或其他胃肠道活跃的炎症性疾病,如溃疡性结肠炎或克罗恩病,由于非甾体类抗炎药可能会加剧病情。
- 布洛芬治疗的发热和疼痛有时有可能是某种严重疾病的潜在征兆。如症状持续或恶化,或出现新的症状,患者应停药并咨询医生。
- 布洛芬很少被报道会导致胆管消失综合征。如果患者出现突然腹痛或慢性腹痛,并伴有食欲丧失和/或新发瘙痒,应及时就医并咨询专业医生。

## 【药物相互作用】

- 本品与其他解热、镇痛、抗炎药物同用时可增加胃肠道的不良反应,并可能导致溃疡。
- 本品与肝素、双香豆素等抗凝药同用时,可导致凝血酶原时间延长,增加出血倾向。
- 本品与地高辛、甲氨蝶呤、口服降血糖药物同用时,能使这些药物的血药浓度增高,不宜同用。
- 本品与呋塞米(呋喃苯胺酸)同用时,后者的排钠和降压作用减弱;与抗高血压药同用时,也降低后者的降压效果。
- 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

## 【药理作用】

本品能抑制前列腺素的合成,具有解热镇痛及抗炎作用。

## 【贮藏】

遮光,密封,不超过 30°C 保存。

## 【包装】

口服液体药用聚丙烯瓶、口服药用高密度聚乙烯旋盖,100ml/瓶,每盒 1 瓶。

## 【有效期】

24 个月

## 【执行标准】

国家药品监督管理局药品注册标准 YBH18042024

## 【批准文号】

国药准字 H20244754

## 【说明书修订日期】

2024 年 10 月 12 日

## 【药品上市许可持有人】

名称:北京诚济制药股份有限公司  
注册地址:北京市顺义区中北工业区(北石槽镇)  
邮政编码:101301  
联系方式:010-62991779  
传真:010-53934516

## 【生产企业】

企业名称:北京诚济制药股份有限公司  
生产地址:北京市顺义区中北工业区(北石槽镇)  
邮政编码:101301  
电话号码:010-62991779  
传真号码:010-53934516  
如有问题可与上市许可持有人联系

## 瓶盖开启/关闭法



- 开启时需用力按下外瓶盖同时反时针方向转动,即可打开。
- 关闭时顺时针方向拧紧外瓶盖即可。

B363A01